

猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株）说明书

【兽药名称】

通用名 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株）

商品名 泰吉联

英文名 Swine Foot and Mouth Disease Bivalent Vaccine, Inactivated（Strain Re-O/MYA98/JSCZ/2013 + Strain Re-A/WH/09）

汉语拼音 Zhu Koutiyi O Xing A Xing Erjia Miehuoyimiao（Re-O/MYA98/JSCZ/2013 Zhu + Re-A/WH/09 Zhu）

【主要成份与含量】含灭活的口蹄疫病毒Re-O/MYA98/JSCZ/2013株和Re-A/WH/09株。每头份疫苗中含O型和A型总146S含量应不低于3.0μg，各型病毒含量均应不低于1.5μg。

【性状】乳白色略带粘滞性乳液。

【作用与用途】用于预防猪O型、A型口蹄疫。免疫期为6个月。

【用法与用量】肌肉注射。每头猪2.0ml。

【不良反应】（1）正常反应 注射动物精神、食欲正常，注射局部无明显变化，仅体温一过性升高，1日内恢复，无其他可见临床体征变化。

（2）一般不良反应 个别动物注射部位轻微肿胀、体温升高持续0.5~1℃、减食或停食1~2顿，随着时间延长，症状逐渐减轻、消失。

（3）严重不良反应 因品种、个体的差异，个别猪接种后可能会出现因过敏原引起的急性过敏反应，如焦躁不安、呼吸加快、肌肉震颤等，甚至因抢救不及时而死亡；少数怀孕动物可能出现流产。

【注意事项】（1）疫苗应在2~8℃下冷藏运输，不得冻结，并尽快运往使用地点。运输和使用过程中避免日光直射。

（2）使用前应仔细检查疫苗。疫苗中若有其他异物、瓶体有裂纹或封口不严、破乳、变质者不得使用。使用时应将疫苗恢复至室温并充分摇匀。疫苗瓶开启后限当日用完。

（3）本疫苗仅接种健康猪。病畜、瘦弱、怀孕后期母畜及断奶前幼畜慎用。

（4）严格遵守操作规程。注射器具和注射部位应严格消毒，每头更换1次针头。曾接触过病畜人员，在更换衣、帽、鞋和进行必要消毒之后，方可参与疫苗注射。

（5）疫苗对安全区、受威胁区、疫区猪均可使用。疫苗应从安全区到受威胁区，最后再注射疫区内受威胁畜群。大量使用前，应先小试，在确认安全后，再逐渐扩大使用范围。

（6）在非疫区，注苗后21日方可移动或调运。

（7）在紧急防疫中，除用本品紧急接种外，还应同时采用其他综合防控措施。

（8）个别猪出现严重过敏反应时，应及时使用肾上腺素等药物进行抢救，同时采用适当的辅助治疗措施。

（9）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗进行消毒处理。

【规格】（1）20ml/瓶 （2）30ml/瓶 （3）50ml/瓶 （4）80ml/瓶 （5）100ml/瓶 （6）250ml/瓶

【包装】（1）20ml/瓶×100瓶/箱 （2）30ml/瓶×40瓶/箱 （3）30ml/瓶×100瓶/箱 （4）50ml/瓶×40瓶/箱

（5）50ml/瓶×100瓶/箱 （6）100ml/瓶×20瓶/箱 （7）100ml/瓶×50瓶/箱 （8）250ml/瓶×20瓶/箱

（9）250ml/瓶×40瓶/箱 （10）250ml/瓶×50瓶/箱

【贮藏与有效期】2~8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】兽药生字280187542

【生产企业】申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公司

地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2398号

邮编：730300

电话：0931-5111122

技术服务热线：400-620-6808

<http://www.slbio.com.cn/>

仅在兽医指导下使用