

口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株）说明书

【兽药名称】

通用名 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株）

商品名 泰瑞联

英文名 Foot and Mouth Disease Bivalent (Type O and A) Vaccine, Inactivated (Strain O/MYA98/BY/2010 + Strain Re-A/WH/09)

汉语拼音 Koutiyi O Xing Axing Erjia Miehuoyimiao (O/MYA98/BY/2010 Zhu+Re-A/WH/09 Zhu)

【主要成份与含量】 含有灭活的口蹄疫O型 O/MYA98/BY/2010株、A型 Re-A/WH/09株病毒，每1ml疫苗中含有O型和A型总146S含量应不低于1.0 μ g，每0.2ml病毒液中病毒含量O型、A型分别不低于10^{7.5} LD₅₀和10^{7.0} LD₅₀或O型、A型1ml病毒液中病毒含量分别不低于10^{7.5} TCID₅₀和10^{7.5} TCID₅₀。

【性状】 乳白色略带粘滞性乳液。

【作用与用途】 用于预防牛、羊O型和A型口蹄疫。免疫期为6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。每头牛1ml，每只羊0.5ml。

【不良反应】 （1）正常反应 注射动物精神、食欲正常，注射局部无明显变化，泌乳正常，仅体温一过性升高，1日内恢复，无其他可见临床体征变化。一般不良反应 个别动物注射部位轻微肿胀、体温升高持续0.5~1℃、减食或停食1~2顿，奶牛可出现一过性泌乳量减少，随着时间延长，症状逐渐减轻、消失。严重不良反应 因品种、个体的差异，个别牛接种后可能会出现因过敏原引起的急性过敏反应（如焦躁不安、呼吸加快、肌肉震颤、可视黏膜充血、瘤胃鼓气、鼻腔出血等，甚至因抢救不及时而死亡；少数怀孕母牛可能出现流产）。

【注意事项】 （1）疫苗应在2~8℃冷藏运输，不得冻结，并尽快运往使用地点。运输和使用过程中避免日光直射。

（2）使用前应仔细检查疫苗。疫苗中若有其它异物、瓶体有裂纹或封口不严、破乳、变质者不得使用。使用时应将疫苗恢复至室温并充分摇匀。疫苗瓶开启后限当日用完。

（3）本疫苗仅接种健康牛。病畜、瘦弱、怀孕后期母畜及断奶前幼畜慎用。

（4）严格遵守操作规程。注射器具和注射部位应严格消毒，每头更换1次针头。曾接触过病畜人员，在更换衣、帽、鞋和进行必要消毒之后，方可参与疫苗注射。

（5）疫苗对安全区、受威胁区、疫区牛均可使用。疫苗应从安全区到受威胁区，最后再注射疫区内受威胁畜群。大量使用前，应先小试，在确认安全后，再逐渐扩大使用范围。

（6）在非疫区，注射后21日方可移动或调运。

（7）在紧急防疫中，除用本品紧急接种外，还应同时采用其他综合防控措施。

（8）个别牛出现严重过敏反应时，应及时使用肾上腺素等药物进行抢救，同时采用适当的辅助治疗措施。

（9）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗进行消毒处理。

【规格】 （1）20ml/瓶 （2）50ml/瓶 （3）100ml/瓶 （4）250ml/瓶

【包装】 （1）20ml/瓶×100瓶/箱 （2）50ml/瓶×100瓶/箱 （3）100ml/瓶×50瓶/箱 （4）250ml/瓶×50瓶/箱

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】 兽药生字280187538

【生产企业】 申联生物医药(上海)股份有限公司兰州分公司

地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段 2398 号 邮编：730300

电话：0931-5111122 技术服务热线：400-620-6808 <http://www.slbio.com.cn/>

仅在兽医指导下使用