



兽用

## 猪链球菌病、传染性胸膜肺炎二联灭活疫苗（2型ZY-2株+1型SC株）说明书

### 【兽药名称】

通用名 猪链球菌病、传染性胸膜肺炎二联灭活疫苗(2型ZY-2株+1型SC株)

商品名 传联清

英文名 Swine Streptococcosis and Infectious Pleuropneumonia Vaccine, Inactivated (Type 2, Strain ZY-2+Type 1, Strain SC)

汉语拼音 Zhulianqijunbing Chuanranxingxiongmofeiyan Erlian miehuoyimiao (2 Xing, ZY-2 Zhu+1 Xing, SC Zhu)

【主要成份与含量】疫苗含猪链球菌 2 型 ZY-2 株和猪胸膜肺炎放线杆菌 SC 株, 每毫升疫苗含 ZY-2 株灭活前菌数介于  $1.0 \times 10^6$ CFU ~  $1.5 \times 10^6$ CFU 之间, 含 SC 株灭活前菌数介于  $1.0 \times 10^6$ CFU ~  $1.5 \times 10^6$ CFU 之间。

【性状】乳白色乳剂。

【作用与用途】用于预防由猪链球菌2型引起的猪链球菌病和猪胸膜肺炎放线杆菌1型引起的猪传染性胸膜肺炎。免疫期为4个月。

【用法与用量】肌肉注射, 每头份2ml。健康仔猪28~35日龄进行免疫。

【不良反应】个别猪只可能会出现轻微应激反应, 注射肾上腺素缓解, 1 ~ 2 日自行恢复。

【注意事项】(1)未使用过本疫苗的地区, 应先小范围试用, 观察 3 ~ 5 日, 证明确实安全后才能扩大使用。

(2)紧急预防时应先在疫区周围使用, 再到疫区使用。

(3)疫苗应恢复至常温使用, 使用前及使用过程中均应充分摇匀。

(4)疫苗过期、变色或疫苗瓶破损均不得使用。

(5)针头、注射器应灭菌, 注射部位应消毒, 每头猪应更换针头。

(6)体弱及病猪不得使用该疫苗。

(7)疫苗开封后须 4 个小时内用完。

(8)用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】(1) 10ml/瓶 (2) 20ml/瓶 (3) 40ml/瓶 (4) 100ml/瓶 (5) 200ml/瓶

【包装】(1) 40瓶/箱 (2) 100瓶/箱

【贮藏与有效期】2°C ~ 8°C 保存, 有效期为 12 个月。

【批准文号】兽药生字280181168

【生产企业】申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公司

地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2398号

邮编：730300

电话：0931-5111122

技术服务热线：400-620-6808

<http://www.slbio.com.cn/>

仅在兽医指导下使用