



兽用

猪口蹄疫O型、南非1型二价灭活疫苗(Re-O/CATHAY/2024株+Re-O/MYA98/2023株+Re-SAT1/2026株)说明书

【兽药名称】

通用名称：猪口蹄疫O型、南非1型二价灭活疫苗（Re-O/CATHAY/2024株+Re-O/MYA98/2023株+Re-SAT1/2026株）

商品名称：泰优联

英文名称：Swine Foot and Mouth Disease（Type O and SAT1）Bivalent Vaccine, Inactivated（Strain Re-O/CATHAY/2024+Strain Re-O/MYA98/2023+Strain Re-SAT1/2026）

汉语拼音：Zhu Kouitiyi O Xing Nanfeiyixing Erjia Miehuoyimiao（Re-O/CATHAY/2024 Zhu+Re-O/MYA98/2023 Zhu+Re-SAT1/2026 Zhu）

【主要成分与含量】 含灭活的口蹄疫O型Re-O/CATHAY/2024株、Re-O/MYA98/2023株和南非1型Re-SAT1/2026株病毒；每头份疫苗中含O型和南非1型总146S含量为15.0μg。

【性状】 乳白色略带粘滞性乳液。

【作用与用途】 用于预防口蹄疫病毒O型Cathay拓扑型、缅甸98（Mya-98）谱系和南非1型III拓扑型引起的猪口蹄疫。免疫产生期为28日，免疫期暂定为6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。每头猪2.0 ml。

【不良反应】 **正常反应** 注射动物精神、食欲正常，注射局部无明显变化，仅体温一过性升高，1日内恢复，无其他可见临床体征变化。**一般不良反应** 个别动物注射部位轻微肿胀、体温升高持续0.5~1℃、减食或停食1~2顿，随着时间延长，症状逐渐减轻、消失。**严重不良反应** 因品种、个体的差异，个别猪接种后可能会出现因过敏原引起的急性过敏反应，如焦躁不安、呼吸加快、肌肉震颤等，甚至因抢救不及时而死亡；少数怀孕动物可能出现流产。

【注意事项】 1 疫苗应在2~8℃冷藏运输，不得冻结，并尽快运往使用地点。运输和使用过程中避免日光直射。

2 使用前应仔细检查疫苗。疫苗中若有其他异物、瓶体有裂纹或封口不严、破乳、变质者不得使用。使用时应将疫苗恢复至室温并充分摇匀。疫苗瓶开启后限当日用完。

3 本疫苗仅接种健康猪。病畜、瘦弱、怀孕后期母畜及断奶前幼畜禁用。

4 严格遵守操作规程。注射器具和注射部位应严格消毒，每头更换1次针头。曾接触过病畜人员，在更换衣、帽、鞋和进行必要消毒之后，方可参与疫苗注射。

5 疫苗对安全区、受威胁区、疫区猪均可使用。疫苗应从安全区到受威胁区，最后再注射疫区内受威胁畜群。大量使用前，应先小试，在确保安全后，再逐渐扩大使用范围。

6 在非疫区，注射后28日方可移动或调运。

7 在紧急防疫中，除用本品紧急接种外，还应同时采用其他综合防控措施。

8 个别猪出现严重过敏反应时，应及时使用肾上腺素等药物进行抢救，同时采用适当的辅助治疗措施。

9 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】（1）20ml/瓶 （2）50ml/瓶 （3）100ml/瓶

【包装】（1）20ml/瓶×100瓶/箱 （2）50ml/瓶×100瓶/箱 （3）100ml/瓶×50瓶/箱

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期暂定为18个月。

【批准文号】 兽药临字280187562

【生产企业】 申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公司

地址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2398号

邮编：730300

电话：0931-5111122

技术服务热线：400-620-6808

http://www.slbio.com.cn/

仅在兽医指导下使用